DESCRIPTIONS OF THREE NEW SPECIES OF THE GENUS *PSILOTRETA* (TRICHOPTERA, ODONTOCERIDAE) FROM CHINA

YUAN Hong-Yin, YANG Lian-Fang*
Department of Entomology, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China

Abstract Three new species of Psilotreta are described and illustrated from China, i. e. P. apiculata sp. nov., P. superposita sp. nov. and P. monacantha sp. nov., bringing the number of Chinese Psilotreta species to 32, about 50 % of the world fauna of the genus (67 species). Psilotreta apiculata group, including P. apiculata sp. nov. and P. superposita sp. nov., is recognized by three synapomorphies: the maxillary palp with segment II slightly shorter than segment I, and absence of both intermediate appendage of X and paramere. Psilotreta monacantha group, including P. monacantha sp. nov. only, is also probably monophyletic, as evidenced by two synapomorphies: absence of DC on male forewings and with R₃, R₄ and R_5 sharing the same base.

1 Psilotreta apiculata sp. nov. (Figs 1 - 5)

This species is very similar to *P. frigidaria* Mey, 1997, from Vietnam, but differs from it by male genitalia in: 1) base of lateral process of X extending posteriorly beyond the apex of median dorsal process of segment IX + X (lateral process of X extending posteriorly not to the apex of median dorsal process in *P. frigidaria*); 2) paramere absent (with one pair of parameres in *P. frigidaria*).

Holotype &, Anhui Province, Jingxian County (30.7° N, 118.35° E; alt. 120 m), 8 June 1990, Dingxi Stream, 31 km East of Jing County, 8 June 1990, coll. YANG Lian-Fang.

Etymology. The Latin word "apiculatus" means "acuate", in reference to the shape of lateral process of X of male genitalia.

2 Psilotreta superposita sp. nov. (Figs 6 – 10)

This species is different from all other members within this genus in: median dorsal process of segment X short and situated right beneath that of segment IX, not visible in dorsal view (extending posteriorly from the median dorsal process of segment IX, or confused with that of segment IX in other species of the genus).

Holotype ♂, Guangdong Province, Yangchun County, Xinhe Village, 16 km Northwest of Yongning Town, Hecang Stream (22.3° N, 111.5° E; alt.

393 m), 27 May 2004, coll. YANG Lian-Fang, ZHOU Xin. Paratypes: 2 & & , Guangdong Province, Xinyi County, Dacheng Town, Dawuling Nature Reserve, stream inside entrance of reserve (22.2°N, 111.1°E; alt. 1 021 m), 26 May 2004, coll. ZHOU Xin; 4 & & , Guangdong Province, Xinyi County, Dacheng Town, Dawuling Nature Reserve, upstream of the stream at the entrance of reserve (22.2°N, 111.1°E; alt. 1 110 m), 26 May 2004, coll. SUN Chang-Hai; 5 & & , Guangdong Province, Longmen County, Nankun Shan Provincial Nature Preserve, Tian Tang Ding River (23.6°N, 113.8°E; alt. 542 m), 16 May 2004, coll. John C. Morse and YANG Lian-Fang.

Etymology. The Latin word "superpositus" means "overlapped", in reference to the median dorsal process of segment X situating right ventrad to that of segment IX.

3 Psilotreta monacantha sp. nov. (Figs 11 – 15)

This species is very similar to *P. papaceki* Malicky, 1995, from Vietnam, but differs from it by characters of male genitalia in: the slender lateral process of X abruptly recurved at its base with its acuate apex directed anterior-laterad, and with a small spine on its ventral margin near base (extending posteriorly, without any spine on its ventral margin in *P. papaceki*).

Holotype & Hunan Province, Yizhang County, Mang Shan National Nature Reserve, Xiangsi Keng near bridge, about 200 m South of Nature Reserve Gate (24.95°N, 112.98°E; alt. 1 332 m), 18 May 2004, coll. John C. Morse and YANG Lian-Fang. Paratypes: 1 & , 1 ♀ , same data as holotype; 4 & & , Guangdong Province, Ruyuan County, Nanling National Nature Reserve, unnamed tributary of Laopeng Keng (24.91°N, 113.03°E; alt. 935 m), 18 May 2004, coll. John C. Morse and SUN Chang-Hai.

Etymology. The Greek word "monacanthus" means "one spine", in reference to each lateral process of X with one small spine.

Key words Odontoceridae, Psilotreta, new species, species group.

^{*} Corresponding author, E-mail: lfyang@ njau. edu. cn

This research was supported by National Natural Science Foundation of China (30870345) and National Natural Science Foundation of the United States of America (DEB0316504). (国家自然科学基金 (30870345) 和美国自然科学基金 (DEB0316504) 项目资助)

Received 19 July 2012, accepted 22 Nov. 2012.

中国裸齿角石蛾属三新种 (毛翅目,齿角石蛾科)

袁红银 杨莲芳*

南京农业大学昆虫系 南京 210095

摘 要 描述了裸齿角石蛾属 3 新种: 细尖裸齿角石蛾 *Psilotreta apiculata* sp. nov., 叠肢裸齿角石蛾 *Psilotreta superposita* sp. nov. 和单刺裸齿角石蛾 *Psilotreta monacantha* sp. nov., 并提供了中国及邻近地区该属种类的种组检索表。模式标本保存于南京农业大学昆虫标本馆。

关键词 齿角石蛾科,裸齿角石蛾属,新种,种组.中图分类号 Q969.411.9

裸齿角石蛾属 Psilotreta 隶属于齿角石蛾科, 模式 种 Psilotreta frontalis Banks, 1899。截至本文, 作者已 发表该属的 16 新种和 1 新纪录种 (Yuan et al., 2007; Yuan et al., 2008; Yuan & Yang, 2008, 2010, 2011)。根据雄虫翅脉、下颚须、雄外生殖器结构及 阳基侧突的数目与形状等特征,作者对该属进行了 种组研究,将该属中国以及邻近国家的种类分为5 种组。其中,广东裸齿角石蛾种组 Psilotreta kwantungensis group (Yuan & Yang, 2008, 2010)、加 氏裸齿角石蛾种组 Psilotreta jaroschi group (Yuan & Yang, 2010) 和该属较原始的分支中华裸齿角石蛾 种组 Psilotreta chinensis group (Yuan et al., 2007, 2008) 等3种组已描述。新种 Psilotreta apiculata sp. nov. 和 Psilotreta superposita sp. nov. 隶属细尖裸齿角石蛾种组 Psilotreta apiculata group, 共同特征为: 下颚须第2节 略短于第1节,雄外生殖器第10节中附肢缺如,阳 基侧突缺如;新种 Psilotreta monacantha sp. nov. 的下颚 须第2节长约为第1节的1/2, 雄外生殖器第10节 侧突上具1刺状突起,中附肢缺如,前翅缺分径室 DC, R_3 、 R_4 、 R_5 共柄, 据此建立单刺裸齿角石蛾种 组 Psilotreta monacantha group。至此,我国裸齿角石蛾 属种类增至32种,几乎占世界该属已知种类(67 种)的50%。形态学术语应用Parker (Parker et al., 1987) 及 Zhong (Zhong et al., 2006)。模式标本保 存于南京农业大学昆虫标本馆。

1 细尖裸齿角石蛾,新种 *Psilotreta apiculata* sp. nov. (图 1~5)

前翅长 9.3 mm (n = 1), 体淡黄褐色。

下颚须第1节长度为0.3 mm,第 $1 \sim 5$ 节长度比为1.0:0.6:1.3:1.4:1.8 (n=1)。

前翅分径室 DC 约为翅长的 1/3, 径脉 R_2 发自 DC 基部 4/5, F \parallel 柄长约为分横脉 s 的 3 倍, 无径中横脉 r-m, 即中脉 M 直接发自 F \parallel 基柄(同北美种

类), Cu_2 末端残留脉明显。后翅分径室 DC 约为翅长的 1/3, R_2 发自 DC 基部 3/4,F II 柄长约为 s 的 3 倍,缺径中横脉 r-m, M_{1+2} 与 F II 基柄直接相接,中脉 M 于明斑室 TC 外侧分叉,与 TC 端部的距离约为中肘横脉 m-cu 的 1/4。

雄外生殖器 第9、10节中背突愈合呈长柱形, 背面观端部圆,长约为中宽的3倍,第9节侧前突位 于侧区上半部分,长约为腹缘的2倍,侧、腹毛瘤缺 如腹部仅散生数根刚毛。第10节侧突发自主体端 部,细长,呈鸟翼状,基部宽,伸至第9+10节中背 突端部外侧,侧面观呈弧形向前方弯曲,端部尖,指 向背前方;中附肢缺如。上附肢呈长椭圆形,基部 1/3 最宽, 余部略收窄, 长略短于最宽处的 3 倍, 端 部略圆钝,伸至第10节侧突外侧。下附肢基节基部 1/3 处强烈膨大, 余部明显收窄, 端宽约为最宽处的 1/4 倍, 侧面观末端伸至上附肢亚端部, 腹面观内侧 缘基半部约呈120°钝圆突;端节细长柱状,长约为中 宽的5倍,约为基节长的1/2,端部散生小黑齿,腹 面观近90°折向内侧。阳茎基管状,侧面观腹缘基部 1/4 处具1 钝角突, 长约为中宽的7.5 倍, 端部膨大, 端缘呈弧形; 阳基侧突缺如; 阳茎孔片侧面观呈开口 向后的"V"形。

正模 δ,安徽泾县,丁溪河 (青弋江支流),泾 县东 31 km 处 (30.7°N, 118.35°E;海拔 120 m), 1990-06-08,杨莲芳采。

新种与分布于越南的 Psilotreta frigidaria (Mey, 1997) 非常相似,但根据雄外生殖器特征,可将两者区别:1) 新种第10节侧突基部伸至第9+10节中背突端部外侧,而后者不达中背突端部;2) 新种阳基侧突缺如,而后者具1对阳基侧突。

词源: 新种种名源自拉丁词 "apiculatus",细尖的,用来形容第10节侧突的形状。

分布:中国安徽。

^{*} 通讯作者, E-mail: lfyang@ njau. edu. cn




图 1~5 细尖裸齿角石蛾,新种 *Psilotreta apiculata* sp. nov.

1. 雄虫前翅和后翅 (forewing and hindwing of the male) 2~5. 雄外生殖器 (male genitalia) 2, 5. 侧面观 (lateral view) 3. 背面观 (dorsal view) 4. 腹面观 (ventral view) 5. 阳茎 (phallus)

2 叠肢裸齿角石蛾,新种 *Psilotreta superposita* sp. nov. (图 6~10)

前翅长 6 mm (n = 1), 体黄色。

下颚须第1节长度为0.2 mm, 第1~5节长度比为1.0:0.8:1.8:2.0:2.2 (n = 1)。

前翅分径室 DC 约为翅长的 1/3, 径脉 R₂ 发自 DC 外侧方, 不同于属内其它种类; FII 柄长约为分横脉 s 的 2.5 倍, 径中横脉 r-m 极短, 发自 DC 外侧方。后翅 M₁₊₂与 FII 基柄直接相接, 缺明斑室 TC。

雄外生殖器 第9节中背突背面观似呈正三角形,侧前突位于侧区上半部,较小;侧、腹毛瘤各1对,长椭圆形。第10节中背突位于第9节中背突的下方,端部与第9节中背突端部平齐,区别于属内其它种类,背面观呈心形;主体宽大,侧突发自主体背部,侧面观末端宽片状,端缘圆钝,背面观左右连成一体,端缘中央略内凹,远伸至第10节中背突端部外方;中附肢缺如。上附肢呈椭圆形,长约为中宽的2倍,端部圆钝,略伸至第10节背板的外方。下附肢基节粗长管状,近基部2/5处膨大,余部渐收窄至末端,侧面观端部几乎与第10节侧突顶端平齐,长至少为最宽处的2倍,端宽约为最宽处的1/3,腹面观内缘基部1/3处呈150°角状突,端宽为最宽处的2/3;端节粗短,腹面观近方形,端缘散生小黑齿。

阳茎基侧面观呈微弯的粗管状,长约为中宽的 4.5 倍;端部膨大,端缘斜截,宽约为中宽的 2 倍,腹端角圆钝,约呈 60°;阳基侧突缺如;阳茎孔片侧面观呈开口向后的"V"形。

正模 δ , 广东省阳春县新合村, 永宁镇西北 16 km, 和仓河 (22.3°N, 111.5°E; 海拔 393 m), 2004-05-27, 杨莲芳、周欣采。副模: $2\delta\delta$, 广东省信宜县大成镇大雾岭保护区入口处小河 (22.2°N, 111.1°E; 海拔 1 021 m), 2004-05-26, 周欣采; $4\delta\delta$, 广东省信宜县大成镇大雾岭保护区上游小河 (22.2°N, 111.1°E; 海拔 1 110 m), 2004-05-26, 孙长海采; $5\delta\delta$, 广东省龙门县南昆山保护区天堂顶河 (23.6°N, 113.8°E; 海拔 542 m), 2004-05-16, John C. Morse、杨莲芳采。

新种与该属内其它成员有明显差别:新种第10节中背突较短小,大部分隐藏于第9节中背突的下方,背面观不易观察到,而其它种类的第10节中背突均伸至第9节中背突外侧,或侧后方,或两者愈合,背面观极易观察到。

词源:新种种名源自拉丁词 "superpositus",叠生的,用来形容短小的第 10 节中背突,呈重叠状位于第 9 节中背突的正下方。

分布:中国广东(阳春,信宜,龙门)。




图 6~10 叠肢裸齿角石蛾,新种 Psilotreta superposita sp. nov.

6. 雄虫前翅和后翅 (forewing and hindwing of the male) 7~10. 雄外生殖器 (male genitalia) 7, 10. 侧面观 (lateral view) 8. 背面观 (dorsal view) 9. 腹面观 (ventral view) 10. 阳茎 (phallus)

3 单刺裸齿角石蛾,新种 *Psilotreta monacantha* sp. nov. (图 11~15)

前翅长 11.3~11.7 mm (n = 4), 体黄褐色。

下颚须第1节长度为0.3 mm,第 $1 \sim 5$ 节长度比为1.0:0.6:2.6:2.8:2.7 (n = 4)。

前翅缺分径室 DC, R_3 、 R_4 和 R_5 共柄, 前翅 R_2 发自 R_1 和 R_3 起点位置的中央附近, M_{1+2} 与 F II 柄 直接相接或其间以极短的径中横脉 r-m 相连。后翅 具分径室 DC, DC 长约为翅长的 1/4, R_2 发自 DC 长的 2/3 处, M_{1+2} 与 F II 柄直接相接或其间以径中横脉 r-m 相连,中脉 M_{1+2} 与 M_{3+4} 于明斑室 TC 的端部分叉。

雄外生殖器 第9、10节中背突愈合,基部宽,余部呈细杆状,背面观呈倒 "T"形;第9节侧前突位于侧区背面1/3,长仅略短于侧板腹缘;侧、腹毛瘤边缘不清晰,仅散生数根刚毛。第10节主体宽大,侧突长针状,发自主体端部,折向前侧方,自基向端部渐尖,近基部腹缘具1小刺;中附肢缺如。上附肢呈长椭圆形,长约为中宽的2.5倍,端部圆钝,伸至第9+10节中背突亚端部。下附肢基节基部1/3膨大,余部渐收窄,端宽为基宽的1/3倍,腹面观基半部粗壮,内

侧缘呈 130°突起,端半部收窄,其宽仅为基半部的 1/2;端节细柱状,腹面观末端略收窄,呈 50°折向内侧,长约为中宽的 2.5 倍,端部密生小黑齿。阳茎基弯管状,侧面观近基部 1/3 处略收窄,长约为中宽的 6.5 倍;阳基侧突 1 对,短刺状,长约为阳茎基的 1/4,端部下弯;阳茎孔片侧面观呈弯钩状。

新种与分布于越南的 Psilotreta papaceki (Malicky, 1995) 非常相似,两者区别在雄外生殖器特征:新种第 10 节侧突长针状,末端折向前侧方,近基部腹缘具 1 小刺,而后者第 10 节侧突指向后方,腹缘缺小刺。

正模 δ , 湖南省宜章县莽山自然保护区相思坑,保护区大门南 200 m 小溪(24.95°N, 112.98°E; 海拔 1 332 m), 2004-05-18, John C. Morse、杨莲芳采。副模: 1δ , 1♀, 采集资料同正模; $4\delta\delta$, 广东省乳源县南岭保护区老蓬坑无名支流(24.91°N, 113.03°E; 海拔 935 m), 2004-05-18, John C. Morse、孙长海采。

词源:新种种名源自希腊复合词"monacanthus", 单刺的,用来形容侧突腹缘具1小刺。

分布:中国湖南(宜章)、广东(乳源)。




图 11~15 单刺裸齿角石蛾,新种 Psilotreta monacantha sp. nov. 11. 雄虫前翅和后翅 (forewing and hindwing of the male) 12~15. 雄外生殖器

11. 雄虫前翅和后翅 (forewing and hindwing of the male) 12~15. 雄外生殖器 (male genitalia) 12, 15. 侧面观 (lateral view) 13. 背面观 (dorsal view) 14. 腹面观 (ventral view) 15. 阳茎 (phallus)

中国及邻近地区裸齿角石蛾属 Psilotreta 种组检索表

- 1. 成虫雄外生殖器下附肢基节呈简单的管状···········2 成虫雄外生殖器下附肢基节常具发达的背、腹叶,似呈二叉状················4
- - ······· 单刺裸齿角石蛾种组 Psilotreta monacantha group

茎具2对阳基侧突(中国,泰国,越南)

······ 加氏裸齿角石蛾种组 Psilotreta jaroschi group

REFERENCES

Banks, N. 1899. Descriptions of new North American neuropteriod insects. *Transactions of the American Entomological* Society, 25: 199 – 218.

Malicky, H. 1995. Neue köcherfliegen (Trichoptera, Insecta)

- aus Vietnam. Linzer. Biol. Beitr., 27: 871 872, 885.
- Mey, W. 1997. Die köcherfliegenfauna des Fan Si Pan-Massivs in Nord-Vietnam. 2. Beschreibung neuer und endemischer Arten aus der Unterordnung Integripalpia (Insecta: Trichoptera). *Entomofauna*, 18 (15): 202 210.
- Parker, C. R. and Wiggins, G. B. 1987. Revision of the caddisfly genus *Psilotreta* (Trichoptera: Odontoceridae). *Royal Ontario Museum Life Science Contributions*, 144: 1 – 55.
- Yuan, H-Y, Sun, C-H and Yang, L-F 2007. Descriptions of two new species of *Psilotreta* (Trichoptera, Odontoceridae) from China. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 32 (4): 947 951. [动物分类学报]
- Yuan, H-Y, Yang, L-F and Sun, C-H 2008. Descriptions of three new species of *Psilotreta* (Trichoptera, Odontoceridae) from China. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 33 (2):116-120. [动物分类学报]
- Yuan, H-Y and Yang, L-F 2008. Descriptions of five new species of *Psilotreta* (Trichoptera, Odontoceridae) from China. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 33 (3): 608 614. [动物分类学报]
- Yuan, H-Y and Yang, L-F 2010. Descriptions of four new species of *Psilotreta* (Trichoptera, Odontoceridae) from China. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 35 (3): 613 618. [动物分类学报]
- Yuan, H-Y and Yang, L-F 2011. Descriptions of two new species and a new record of *Psilotreta* (Trichoptera, Odontoceridae) from China. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 36 (4): 956-960. [动物分类学报]
- Zhong, H, Yang, L-F and Morce, J. C. 2006. Six new species of the genus *Polyplectropus* (Insecta, Trichoptera, Polycentropodidae) from China. *Acta Zootaxonomica Sinica*, 31 (4): 859 866. [动物分类学报]